

Cutimed® Siltec®**Product description**

Cutimed® Siltec® dressings are an assortment of silicone coated foam dressings. Cutimed® Siltec® is a sterile, absorbent polyurethane foam dressing for atraumatic dressing changes that contains super-absorbent stripes which absorb and lock wound exudate. The wound contact surface is a perforated silicone layer that allows adherence to the periwound skin but not to the moist wound bed or to newly formed epithelial tissue. This minimises trauma and pain during dressing changes. The outer film is water-repellent, yet permeable to oxygen and vapour. The foam dressing and the super-absorbent stripes are designed to absorb and to lock away excess wound fluid inside the dressing, promoting a moist wound environment and minimising the risk of maceration. Cutimed® Siltec® is highly conformable and provides protection of the wound site. Cutimed® Siltec® leaves no residues in the wound. The dressing reliably retains wound exudate, even under compression. If necessary the dressing can be cut to size.

Indications

The Cutimed® Siltec® assortment is indicated for exuding wounds such as: venous and arterial ulcers, pressure ulcers, diabetic gangrenes, surgical incisions, skin grafts and donor sites, lacerations or abrasions. Cutimed® Siltec® is recommended for wounds with low to high exudate levels.

Contraindications

Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components.

Warnings and precautions

Cutimed® Siltec® is packaged for single use. Do not re-use or re-sterilise as there is a risk of transmission of body fluids or contaminated tissue between patients. Do not use if pouch is open or damaged. Discard open or unused material. The wound should be inspected for signs of infection and treated according to clinical practice if required.

Do not use externally.

Do not use with oxidising solutions such as hypochlorite or hydrogen peroxide.

Remove the dressing prior radiation therapy.

Cutimed® Siltec®**Description du produit**

Les pansements Cutimed® Siltec® sont un assortiment de pansements revêtus de silicone. Cutimed® Siltec® est un pansement stérile absorbant en polyuréthane conçu pour des changements de pansement atraumatisques, contenant des bandes super-absorbantes qui absorbent et retiennent l'exsudat de la plaie. La surface de contact avec la plaie est une couche perforée de silicone assurant une adhérence à la peau périphérique sans adhérer au lit de la plaie humide ou au tissu épidermique nouvellement formé. Cela permet de limiter les traumatismes et la douleur lors des changements de pansements. Le film extérieur est résistant à l'eau mais perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau.

Le pansement en mousse et les bandes super-absorbantes sont conçus pour absorber les fluides excédentaires de la plaie et les retenir dans le pansement, créant ainsi un environnement humide favorable à la cicatrisation de la plaie en minimisant le risque de macération. Cutimed® Siltec® est hautement conforme et assure la protection du site de la plaie. Cutimed® Siltec® ne laisse aucun résidu dans la plaie. Le pansement assure une retenue fiable de l'exsudat de la plaie, même sous des bandages de compression. Si nécessaire, le pansement peut être découpé à la taille voulue.

Indications

L'assortiment Cutimed® Siltec® est indiqué pour le traitement des plaies exsudatives telles que : ulcères veineux et artériels, ulcères par pression, gangrènes diabétiques, incisions chirurgicales, greffes de peau et sites donneurs, lacerations ou abrasions. Cutimed® Siltec® est recommandé pour le traitement des plaies avec exsudat faible à élevé.

Contre-indications

Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue à l'un des composants du pansement.

Mises en garde et précautions d'emploi

Chaque pansement Cutimed® Siltec® est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser ou restériliser afin d'éviter tout risque de transmission de fluides corporels ou de tissus contaminés entre les patients. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Eliminer tout matériel ouvert ou non utilisé. Il convient d'examiner la plaie pour détecter les signes d'infection et, le cas échéant, de les traiter conformément au protocole clinique habituel.

Uniquement destiné à un usage externe.

Ne pas utiliser avec des solutions oxydantes telles que l'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène.

Retirer le pansement avant administration d'une radiothérapie.

Mode d'emploi

1. Nettoyer la plaie selon le protocole habituel.
2. S'assurer que la peau qui entoure la plaie soit sèche.
3. Choisir une dimension de pansement appropriée, qui couvre la lésion et dépasse des bords de la plaie. **(A)**
4. Ouvrir l'emballage et retirer le pansement. Utiliser une technique stérile.
5. Retirer le film de protection **(B)** et appliquer le pansement avec le côté adhérant vers la plaie. **(C)**
6. Ne pas étirer le pansement.
7. Appliquer un pansement de fixation supplémentaire.
8. Si nécessaire, Cutimed® Siltec® peut être utilisé en combinaison avec d'autres pansements tels que : Cutimed® Sorbact® (pour les plaies infectées) ou Cutimed® Gel (pour les plaies sèches ou nécrotiques).
9. Cutimed® Siltec® peut être utilisé sur une plaie infectée en complément d'un traitement antimicrobien, sous contrôle médical.
10. Cutimed® Siltec® peut rester en place jusqu'à sept jours, en fonction de l'état de la plaie et de la quantité d'exsudat. Il est recommandé de changer le pansement toutes les 24 heures au départ, et de procéder à des changements moins fréquents selon les besoins.
11. Retirer avec précaution le pansement de fixation puis retirer délicatement le pansement Cutimed® Siltec® du lit de la plaie. Jeter le pansement usagé.
12. Si nécessaire, nettoyer la plaie avant d'appliquer un nouveau pansement.


Entreposage

Cutimed® Siltec® doit être stocké à l'abri de l'humidité. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Date : June 2016

Fecha: Junio de 2016

Data: Giugno 2016



Cutimed® Siltec® is appropriate for use in:
Cutimed® Siltec® est adapté pour le traitement des:
Cutimed® Siltec® es apropiado para:

superficial wounds
des plaies superficielles
heridas superficiales
ferite superficiali
oppervlakke wonden
feridas superficiais



Wounds with low to moderate levels of exudate
Des plaies faiblement à modérément exsudatives
Heridas con una exudación poca moderada
Ferite con exsudato da escasso a medio
Wonden met geringe tot matige exsudatie
Feridas com exsudado baixo a moderado

Cutimed® Siltec® is adatto per:
Cutimed® Siltec® è geschikt voor:
Cutimed® Siltec® é adequado para:



Wounds with moderate to high levels of exudate
Des plaies fortement à fortement exsudatives
Heridas con una exudación moderada a alta
Ferite con exsudato da moderado a forte
Wonden met matige tot grote hoeveelheid exsudat
Feridas com exsudado moderado a alto

STERILE

EO

CE

0124

E

0124

E

0124

E

0124

E

0124

E

0124

E

Do not use if package is damaged.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
No usar si el envase presenta daños.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
Bij beschadigde verpakking niet gebruiken.
Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

BSN medical
Made and sterilized in Germany
® = registered trademark
BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg · Germany

Cutimed® Siltec®**Description du produit**

Los apósitos Cutimed® Siltec® son una gama de apósitos de espuma recubiertos de silicona. Cutimed® Siltec® es un apósito de espuma de poliuretano absorbente con el que se consigue realizar cambios atraumáticos, conteniendo bandas super-absorbentes que absorben y retienen el exsudato de la herida. La superficie de contacto con la herida es una capa perforada de silicona, que permite la adherencia a la piel que rodea la herida y no al lecho húmedo de la herida ni al tejido epitelial recién formado. Esto minimiza el trauma y el dolor durante los cambios del apósito. La película exterior es repelente al agua, pero permeable al oxígeno y al vapor.

El apósito de espuma y las bandas superabsorventes se han diseñado para absorber y retener dentro del apósito el exceso de exudado, favoreciendo un entorno húmedo y minimizando el riesgo de maceración. Cutimed® Siltec® es altamente adaptable y proporciona protección al lugar de la herida. Cutimed® Siltec® no deja residuos. El apósito retiene de manera segura el exudado de la herida, incluso bajo vendajes compresivos. El apósito puede cortarse a la medida necesaria.

Indicaciones

La gama de apósitos Cutimed® Siltec® está indicada para heridas exsudativas tales como: úlceras venosas y arteriales, úlceras por presión, gangrenas diabéticas, incisiones quirúrgicas, injertos cutáneos, zonas donantes, laceraciones y abrasiones. Cutimed® Siltec® está recomendado para heridas con un nivel de exudación de bajo a alto.

Contraindicaciones

No utilizar el producto en pacientes con sensibilidad conocida a uno de sus componentes.

Advertencias y precauciones

El apósito Cutimed® Siltec® está ensacado para un solo uso. No se debe reutilizar ni resterilizar, ya que existe riesgo de transmisión entre pacientes de fluidos corporales o de tejidos contaminados. No utilizarlo si el empaque está abierto o dañado. Eliminar cualquier elemento del producto abierto o no utilizado. La herida debe ser examinada para determinar si hay signos de infección y, dado el caso, se debe tratar conforme a la práctica clínica habitual.

Sólo para uso externo.

No utilizar con soluciones oxidantes como el hipoclorito o el peróxido de hidrógeno.

Retirar el apósito antes de aplicar radiación.

Instrucciones de uso

1. Lavar la herida conforme a la buena práctica clínica.
2. Asegurarse de que la piel que rodea la plaie soit sèche.
3. Seleccionar un tamaño de apósito adecuado que cubra la herida y sobape sus bordes. **(A)**
4. Abrir el paquete y retirar el pansement. Utilizar una técnica estérile.
5. Retirar el film de protección **(B)** y aplicar el pansement con el lado adhesivo hacia la herida. **(C)**
6. No estirar el vendaje.
7. Utilizar una fijación adicional para el apósito.
8. En caso necesario, Cutimed® Siltec® se puede usar con otros apósitos como, ej., Cutimed® Sorbact® (en el caso de heridas infectadas) o Cutimed® Gel (para las heridas secas y necróticas).
9. Cutimed® Siltec® se puede aplicar sobre una herida infectada en combinación con una terapia antimicrobiana bajo supervisión médica.
10. Cutimed® Siltec® puede permanecer en la herida durante varios días según el estado de la herida y los niveles de exudación. Se recomienda cambiar el apósito cada 24 horas al principio, e ir disminuyendo la frecuencia del cambio según se requiera.
11. Retirar cuidadosamente la fijación del apósito y quitar con suavidad el apósito Cutimed® Siltec® de la herida y desecharlo.
12. Si fuera necesario, limpiar la herida antes de aplicar un nuevo apósito.

Almacenamiento

Cutimed® Siltec® se debe guardar en un lugar seco. No exponerlo a la luz directa del sol.

Fecha: Junio de 2016

Istruzioni per l'uso

Cutimed® Siltec®**Descripción del producto**

Cutimed® Siltec® es un assortimento de medicaciones en gommapiuma siliconica. Cutimed® Siltec® es una medicacion a schiuma in poliuretano absorbente y estérile para el cambio atraumático delle medicazioni contenente strisce superassorbenti que absorben e trattengono l'esudato. La superficie di contatto con la ferita es composta da uno strato di silicone perforato che permette un'aderenza alla cute perilesionale ma non al letto umido della ferita né al tessuto epiteliale di la ferita ni al tejido epitelial recién formado. Esto minimiza el trauma y el dolor durante los cambios del apósito. La pelcula exterior es idrorepellente, ma allo stesso tempo permeabile a ossigeno e vapore.

La medicacion en gommapiuma e le strisce superassorbenti sono progettate per assorbire e trattenere nella medicacione l'esudato della ferita, mantenendo un ambiente umido nella lesion e minimizzando il rischio di macerazione. Cutimed® Siltec® es altamente adaptabile y proporciona proteccion al lugar de la herida. Cutimed® Siltec® no dejá residuos. El apósito retiene de manera segura el exudado de la herida, incluso bajo vendajes compresivos. El apósito puede cortarse a la medida necesaria.

Indicaciones

El assortimento Cutimed® Siltec® è indicato per ferite essudanti quali: úlceras venosas e arteriales, lesioni da pressione, cancrene diabetiche, incisioni chirurgiche, trapianti cutanei e siti donatori, lacerazioni o abrasioni. Cutimed® Siltec® è raccomandato per ferite con livelli di exsudato da lieve ad elevato.

Contraindicaciones

No utilizar su paziente con sensibilità nota a uno componente del producto.

Advertenze e precauzioni

Cutimed® Siltec® è un dispositivo monouso. Non riutilizzare né risterilizzare per evitare rischi di trasmissione di fluidi corporei tra pazienti. Non utilizzare se il confezionamento primario non è integro. Non utilizzare residui di medicazione. Controllare che la ferita non presenti segni di infezione ed, eventualmente, trattarla secondo il protocollo in uso per le lesioni infette. Per solo uso esterno. Non utilizzare con soluzioni ossidanti come ipoclorito o perossido di idrogeno.

Rimuovere la medicacion prima della radioterapia.

Aanwijzingen voor gebruik

1. Maak de wond volgens correct klinisch gebruik schoon.
2. Zorg ervoor dat de huid eromheen droog is.
3. Kies de juiste maat verband die de wond bedekt en de wondranden overlapt. **(A)**
4. Open de verpakking en haal het verband erauit. Zorg dat het verband steriel blijft.
5. Verwijder beschermlaag **(B)** en breng het verband aan met de kleefzijde naar de wond gericht. **(C)**
6. Het verband niet oprekken.
7. Breng extra fixerend verband aan.
8. Indien nodig kan Cutimed® Siltec® gebruikt worden in combinatie met andere verbanden zoals Cutimed® Sorbact® (bij geïnfecteerde wonden) of Cutimed® Gel (voor droge, necrotische wonden).
9. Cutimed® Siltec® può essere utilizzata su ferite infette in aggiunta a terapia antimicrobica sotto supervisione medica.
10. Cutimed® Siltec® può rimanere in situ per un massimo di sette giorni, in funzione delle condizioni della lesione e del livello di exsudato.
11. Cutimed® Siltec® kan worden gebruikt bij een geïnfecteerde wond, als aanvulling op een anti-bacteriologische behandeling onder medisch toezicht.
12. Cutimed® Siltec® kan worden gebruikt bij een geïnfecteerde wond, als aanvulling op een anti-bacteriologische behandeling onder medisch toezicht.
13. Si recomienda cambiar la medicacion inicialmente ogni 24 ore per arrivare poi a cambi meno frequenti.
14. Rimuovere con attenzione il fissaggio della medicacione e togliere delicatamente Cutimed® Siltec® dalla fer

Descrição do produto

Cutimed® Siltec® é um sortimento de curativos de espuma siliconada. Cutimed® Siltec® é um curativo de espuma de poliuretano estéril e absorvente para trocas de curativos atraumáticos, contendo listras superabsorventes que absorve e contém o exsudado da ferida. A superfície de contato da ferida é uma camada de silicone perfurado que permite a aderência à pele da periferida, mas não ao leito da ferida úmida ou ao tecido epitelial recém-formado. Isto minimiza o trauma e a dor durante as trocas de curativos. O filme externo é à prova d'água, mas permeável a oxigênio e vapor. O curativo de espuma e as listras superabsorventes foram projetados para absorver e conter fluido excessivo da ferida dentro do curativo, promovendo um ambiente de ferida úmida e minimizando o risco de maceração. Cutimed® Siltec® é altamente conformável e fornece proteção do local da ferida. Cutimed® Siltec® não deixa resíduos na ferida. O curativo mantém o exsudado da ferida, mesmo sob ataduras elásticas. Se necessário, o curativo pode ser cortado no tamanho desejado.

Indicações

A linha Cutimed® Siltec® é indicada para feridas exsudativas como: úlceras venosas e arteriais, úlceras de pressão, gangrenas diabéticas, incisões cirúrgicas, enxertos de pele e áreas doadoras, lacerações ou abrasões. Cutimed® Siltec® é recomendado para feridas com níveis de exsudado de baixos a altos.

Contraindicações

Não utilize em pacientes com sensibilidade conhecida a nenhum dos componentes do produto.

Alertas e precauções

Cutimed® Siltec® está embalado para utilização única. Não reutilizar ou reesterilizar, já que isso apresenta um risco de transmissão de fluidos corporais ou tecidos contaminados entre os pacientes. Não utilize se a bolsa estiver aberta ou danificada. Elimine material aberto ou não utilizado do dispositivo. A ferida deve ser inspecionada quanto a sinais de infecção e tratada de acordo com a prática clínica. Apenas para uso externo. Não use com soluções oxidantes como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio. Remova o curativo antes da radioterapia.

Instruções de uso

1. Limpe a ferida de acordo com a boa prática clínica.
2. Certifique-se de que a pele ao redor esteja seca.
3. Escolha um tamanho de curativo apropriado que cubra a ferida e se sobreponha às bordas da ferida. **(A)**
4. Abra a bolsa e retire o curativo. Assegure a esterilidade.
5. Remova o filme protetor **(B)** e aplique com o lado aderente sobre a ferida. **(C)**
6. Evite esticar o curativo.
7. Aplique fixação adicional do curativo.
8. Se necessário, o Cutimed® Siltec® pode ser usado em combinação com outros curativos, por exemplo, o Cutimed® Sorbact® (em caso de feridas infectadas) ou o Cutimed® Gel (para feridas necróticas secas).
9. Cutimed® Siltec® pode ser utilizado em uma ferida infectada além da terapia antimicrobiana sob supervisão médica.
10. Cutimed® Siltec® pode permanecer no local por até sete dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis de exsudado. Recomenda-se trocar o curativo a cada 24 horas inicialmente, passando a trocas menos frequentes, se necessário.
11. Remova cuidadosamente a fixação do curativo e retire cuidadosamente o Cutimed® Siltec® da ferida e jogue fora.
12. Se necessário, limpe a ferida, antes da aplicação de um novo curativo.

Armazenamento

Cutimed® Siltec® deve ser armazenado em local seco. Não exponha à luz solar direta.

Data: Junho de 2016

Indikationer

Cutimed® Siltec® sortiment är indicerat för vätskande sår såsom: venösa och arteriella sår, trycksår, diabetesrelaterad gangrän, operationssår, hudtransplantationer och donörställen, skärsår eller skrubbsår. Cutimed® Siltec® rekommenderas för sår med låga till höga vätskenivåer.

Kontraindikationer

Får inte användas för patienter med känd överkänslighet mot någon av produktens komponenter.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Cutimed® Siltec® är förpackad för engångsbruk. Får ej återanvändas eller resteriliseras, då det finns en risk för överföring av kroppsväskor eller kontaminerad vävnad mellan patienter. Får inte användas om förpackningen är bruten eller skadad. Kassera öppnat eller övanvändt material. Inspektera om det finns tecken på infektion i såret och behandla i så fall enligt klinisk praxis. Endast för utvärtes bruk.

Får inte användas tillsammans med oxiderande lösningar, som t.ex. hypoklorit eller väteperoxid. Ta bort förbandet före strålebehandling.

Bruksanvisning

1. Rengör sårer enligt klinisk praxis.
2. Se till att den omgivande huden är torr.
3. Välj en lämplig förbandstorlek som täcker sårer och överlappar sårkanterna. **(A)**
4. Öppna påsen och ta ut förbandet. Säkerställ att det är steril.
5. Ta bort skyddsfilmen **(B)** och fast med den vidhäftande sidan mot såret. **(C)**
6. Undvik att sträcka förbandet.
7. Fixera förbandet ytterligare.
8. Cutimed® Siltec® kan vid behov användas tillsammans med andra förband, t.ex. Cutimed® Sorbact® (för infekterade sår) eller Cutimed® Gel (för torra, necrotiska sår).
9. Cutimed® Siltec® får användas på infekterade sår tillsammans med antimikrobiell behandling under medicinsk övervakning.
10. Cutimed® Siltec® kan vara kvar på plats i upp till sju dagar, beroende på sättlilståndet och vätskenivåerna. Vi rekommenderar att förbandet tas en gång om dygnet i början och därefter mindre ofta efter behov.
11. Ta försiktigt bort förbandet, och avlägsna försiktigt Cutimed® Siltec® från sårer och släng bort det.
12. Vid behov kan du rengöra sårer innan du sätter på ett nytt förband.

Förvaring

Cutimed® Siltec® bör förvaras torrt. Får ej utsättas för direkt solljus.

Datum: Juny 2016

Indikasjoner

Cutimed® Siltec®-utvalget er indiset for væskende sår som venøse og arterielle sår, tryksår, diabetesrelatert gangrän, operasjonssår, hudtransplantasjoner og donorsteder, flenger eller skrubbsår. Cutimed® Siltec® anbefales for lite til sterkt væskende sår.

Kontraindikasjoner

Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for noen av produktkomponentene.

Advarsler og forholdsregler

Cutimed® Siltec® er pakket for engangsbrug. Må ikke gjenbruges eller resteriliseres, da dette medfører fare for overføring av kropsvæske eller kontamineret væv mellom pasienter. Må ikke brukes hvis posen er åpen eller skadet. Kast åpne og delvis brukte pakninger. Inspiser såret for tegn på infeksjon og behandle det ved behov i samsvar med god klinisk praksis. Kun til utværtes bruk.

Må ikke brukes sammen med oxiderende midler, for eksempel hypoklorit og hydrogenperoxid. Fjern bandasjen før strålebehandling.

Bruksanvisning

1. Rens sårer i samsvar med god klinisk praksis.
2. Se til at den omgivende huden er torr.
3. Velg en passende bandasjestrørelse som dekker sårer og overlapper sårkanterne. **(A)**
4. Åpne posen og ta ut bandasjen. Sørg for sterilitet.
5. Fjern beskyttelsesfilmen **(B)** og sett på bandasjen med den klebende siden mot såret. **(C)**
6. Ikke strekk bandasjen.
7. Fest bandasjen med annen fiksering.
8. Cutimed® Siltec® kan om nødvendig brukes sammen med andre bandasjer, for eksempel Cutimed® Sorbact® (for infiserte sår) eller Cutimed® Gel (for torre, necrotiske sår).
9. Cutimed® Siltec® kan brukes på et infisert sår som et tillegg til antimikrobiell behandling under medisinsk oversvømmelse.
10. Cutimed® Siltec® kan vara kvar på plats i opp til syv dager, avhengig av sårets tilstand og grad av væsking. Det anbefales at bandasjen skiftes hvert døgn i starten. Etter hvert kan bandasjen om ønskelig skiftes sjeldnere.
11. Ta forsiktig bort forbandingen og Cutimed® Siltec® forsiktig fra sårer og kast bandasjen.
12. Rens om nødvendig sårer før du setter på en ny bandasje.

Oppbevaring

Cutimed® Siltec® skal lagres tørt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

Dato: Juni 2016

Brugsvejledning**Cutimed® Siltec®****Käyttöohjeet****Cutimed® Siltec®****Hinweise zur Anwendung****Cutimed® Siltec®**

D

Cutimed® Siltec® é adequado para:
Cutimed® Siltec® är lämpligt att använda för:
Cutimed® Siltec® eger seg til bruk ved:



feridas superficiais
ytliga sår
overfladiske sår
overfladiske sår
pintahavissa
oberflächige Wunden

Cutimed® Siltec® er velegnet til:
Cutimed® Siltec® sovietuu käytettäväksi:
Cutimed® Siltec® ist geeignet für:




Feridas com exsudato baixo a moderado
Sår med lått till mäktig mängd sårvätska
Lite til moderat væskende sår
Sår med lavt til moderat ekssudatniveau
Vahan ja kohtalaista erittävissä haavoissa
Wunden mit schwächer bis mäßiger Exsudation

STERILE EO

CE 0124



Feridas com exsudato moderado a alto
Sår med mäktig till riklig mängd sårvätska
Moderat til sterkt væskende sår
Sår med moderat til højt ekssudatniveau
Vahan ja kohtalaista erittävissä haavoissa
Wunden mit schwächer bis starker Exsudation



Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Använd inte förbandet om förpackningen är skadad.
Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet.
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.
Ala käytä, jos pakaus on vahingottunut.
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

Produktbeschreibung
Cutimed® Siltec®

Cutimed® Siltec® ist ein Sortiment von silikonbeschichteten Schaumverbänden. Cutimed® Siltec® ist ein steriler, absorbierender Polyurethan-Schaumverband, der für atraumatische Verbandwechsel sorgt und Superabsorberstreifen enthält, die zusätzlich Wundexsudat absorbiern und binden. Die Wundkontakteseite besteht aus einer perforierten Silikonenschicht, die an der Wundumgebung haftet, nicht aber am feuchten Bett oder an neu gebildetem Epithelgewebe. Dadurch werden Hautschädigungen und Schmerz während des Verbandwechsels weitestgehend vermieden. Der äußere Abdeckfilm ist wasserabweisend, jedoch sauerstoff- und wasser dampfdurchlässig. Der Schaumverband und die Superabsorberstreifen absorbieren überschüssige Wundflüssigkeit und schließen sie sicher im Produktinneren ein. Hierdurch wird ein physiologisches, feuchtes Wundmilieu unterstützt und gleichzeitig das Risiko von Mazeration reduziert. Cutimed® Siltec® ist außer anschmiegsam und schützt die Wundumgebung. Cutimed® Siltec® hinterlässt kein Rückstände in der Wunde. Der Verband bindet das Wundexsudat sicher, auch unter Kompression. Falls erforderlich, kann der Verband zurechtgeschnitten werden.

Anwendungsgebiete

Cutimed® Siltec® ist indiziert für die Behandlung exsudierender Wunden wie z.B. venöse und arterielle Ulzera, Druckgeschwüre, diabetische Gangrane, Operationswunden, Hauttransplantationen und -Entnahmestellen, Schnitt-/Platzwunden oder Abschürfungen. Cutimed® Siltec® wird empfohlen für Wunden mit schwacher bis starker Exsudation.

Gegenanzeigen

Bitte nicht einsetzen bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Cutimed® Siltec® ist zum einmaligen Gebrauch verpackt. Nicht wieder verwenden oder resterilisieren. Eine Wiederverwendung des Produktes setzt Patienten das Risiko der Übertragung von Körperflüssigkeiten und Gewebefremdkörpern von vorherigen Patienten aus, die Krankheitserreger enthalten können. Nicht verwenden, wenn der Beutel geöffnet oder beschädigt ist. Geöffnetes oder nicht verbrauchtes Material entsorgen. Die Wunde sollte auf Infektionsanzeichen hin untersucht und bei Bedarf gemäß den Regeln klinischer Praxis behandelt werden. Nur zur äußeren Anwendung bestimmt. Nicht in Kombination mit oxidierenden Substanzen, wie z. B. hypochlorithaltige Lösungen oder Wasserstoffperoxid verwenden. (Cutimed® Wundspülung kann vor der Anwendung von Cutimed® Siltec® für die Wundspülung verwendet werden, dies beeinträchtigt die Produkteigenschaften nicht, kann jedoch zu einer leichten Verfärbung des Schaums führen.) Den Verband vor Bestrahlungstherapie entfernen.

Anwendung

1. Reinigen Sie die Wunde gemäß guter klinischer Praxis.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wundumgebung trocken ist.
3. Wählen Sie die Größe der Wundauflage so, dass sie die Wunde bedeckt und die Wundränder überlappt. **(A)**
4. Öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie die Wundauflage. Stellen Sie sicher, dass das Produkt steril bleibt.
5. Entfernen Sie die Schutzfolie **(B)** und applizieren Sie die haftende Seite auf die Wunde. **(C)**
6. Den Verband nicht dehnen.
7. Bringen Sie eine zusätzliche Verbandfixierung an.
8. Falls es die Wunde erfordert, kann Cutimed® Siltec® mit anderen Verbandstoffen kombiniert werden, z.B. mit Cutimed® Sorbact® (bei infizierten Wunden) oder Cutimed® Gel (bei trockenen, nekrotischen Wundarealen).
9. Cutimed® Siltec® kann bei infizierten Wunden ergänzend zu einer antimikrobiellen Therapie eingesetzt werden. Dies sollte unter medizinischer Aufsicht erfolgen.
10. Cutimed® Siltec® kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation. Anfangs sollte der Verband alle 24 Stunden gewechselt werden, um dann zu längeren Verbandwechselintervallen überzuleiten.
11. Entfernen Sie zusätzliche Verbandfixierung und nehmen Sie dann Cutimed® Siltec® saft vom Wundbett ab und entsorgen Sie es.
12. Falls erforderlich, reinigen Sie die Wunde bevor Sie den nächsten Verband aufbringen.

Aufbewahrung

Cutimed® Siltec® sollte trocken gelagert werden. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Stand: Juni 2016

Made and sterilized in Germany

® = registered trademark

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg · Germany

1657166005/00-BR0615/01